


Quatre satellites terrestres artificiels parmi bien d'autres

1. le premier satellite artificiel

1.1 force exercée par la terre sur Spoutnik 1 : Vidéo

$$\vec{F}_{T/S} = -\frac{G.m_s.M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{u}_{TS}$$



1.2 Vidéo (la démonstration vidéo par du principe que la masse du système reste constante donc

que $\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m_s \cdot \vec{v})}{dt} = m_s \cdot \frac{d(\vec{v})}{dt} = m_s \cdot \vec{a}$!)

Seconde loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique :

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquée à un système matériel est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de

mouvement: $\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m_s \cdot \vec{v})}{dt}$

Dans ce cas particulier ou le système conserve une masse constante, la seconde loi devient:

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m_s \cdot \vec{v})}{dt} = m_s \cdot \frac{d(\vec{v})}{dt} = m_s \cdot \vec{a}$$

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m_s \cdot \vec{a} = -\frac{G.m_s.M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{u}_{TS} \Rightarrow \vec{a} = -\frac{G.M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{u}_{TS}$$

2. Les satellites artificiels à orbites circulaires

2.1.1 Vidéo

Mouvement circulaire :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{(R_T + h)} \cdot \vec{n} + \frac{dv}{dt} \cdot \vec{\tau} = -\frac{G.M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{u}_{TS}$$

$$\text{or } \vec{n} = -\vec{u}_{TS}$$

$$\vec{a} = \frac{v^2}{(R_T + h)} \cdot \vec{n} + \frac{dv}{dt} \cdot \vec{\tau} = \frac{G.M_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0$$

La vitesse est constante le mouvement est circulaire uniforme.

2.1.2 Vidéo

Expression de la vitesse v du satellite :

$$\frac{v^2}{(R_T + h)} = \frac{G.M_T}{(R_T + h)^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G.M_T}{R_T + h}}$$

2.1.3 Vidéo

Expression de la période de révolution T :

$$v = \frac{2.\pi.(R_T + h)}{T} \Rightarrow T = \frac{2.\pi.(R_T + h)}{v} = \frac{2.\pi.(R_T + h)}{\sqrt{\frac{G.M_T}{R_T + h}}}$$

$$T = 2.\pi.\sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{G.M_T}}$$

Troisième loi de Kepler :

$$\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_T} = \text{constante}$$

2.2 Cas des satellites géostationnaires

2.2.1 On appelle satellite géostationnaire un satellite qui reste au dessus du même point du globe terrestre. Il est immobile par rapport à un référentiel terrestre.

2.2.2

- La trajectoire de la figure 2 est incompatible avec les lois de la mécanique. En effet la force exercée par la terre est dirigée vers son centre : le centre de la trajectoire circulaire est le centre de la terre.
- Dans le cas de la trajectoire de la figure 3, le satellite n'est pas géostationnaire.

Conclusion : La trajectoire, correspondant au satellite géostationnaire, est celle de la figure 1.

3.1

1^{ière} loi ou loi des orbites elliptiques 1605


Toutes les orbites des satellites sont des ellipses dont le corps attracteur occupe l'un des foyers.

3^{ième} loi ou loi des périodes

La période de révolution au carré divisée par le demi-grand axe 'a' au cube est une constante. Elle ne dépend pas du satellite mais uniquement de la masse M_T du corps attracteur et de la constante d'attraction universelle G :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_T}$$

3.2 Si $\Delta t = t_1 - t_0 = t_3 - t_2$ alors $S_1 = S_2$



3.3 Les distances parcourues entre t_0 et t_1 et t_3 et t_4 sont différentes. Or ces intervalles de temps sont égaux : conclusion : la vitesse n'est pas constante.

3.4 A intervalle de temps égaux, la distance parcourue est la plus importante au point P et la moins importante au point A.

La vitesse maximale du satellite est au point P, sa vitesse minimale est au point A

4. Les missions des satellites artificiels

4.1 Dans le vide :

λ (ultraviolet) < 400 nm- lumière visible-800 nm < λ (infrarouge)

4.2

$$v = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow v_{\min} = \frac{c}{\lambda_{\max}} = \frac{3 \times 10^8}{8 \times 10^{-7}} = \frac{3}{8} \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$$v_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}} = \frac{3 \times 10^8}{4 \times 10^{-7}} = \frac{3}{4} \times 10^{15} \text{ Hz}$$

4.3 La célérité 'c' dépendant du milieu de propagation, la longueur d'onde varie en fonction du milieu traversé.